

CURCULIONIDES

DE L'EXPLORATION LIZER-DELÉTANG AU CHACO BOLIVIEN

PAR A. HUSTACHE

MM. Charles Lizer et Louis F. Delétang m'ayant proposé l'étude des Curculionides rapportés par eux du Chaco bolivien et de la région comprise entre Santa Cruz de la Sierra et Trinidad, je me suis empressé d'accepter leur offre. Les matériaux recueillis sont d'ailleurs d'une importance exceptionnelle; ils se répartissent en effet en plus de deux cents espèces parmi lesquelles 94 espèces et 6 genres sont nouveaux. Mais les espèces du Chaco bolivien ne peuvent rivaliser avec celles du Brésil pour la taille et l'éclat de la coloration; le plus grand nombre d'entre elles sont de petite taille et de modeste livrée. Dans certains genres il eut été imprudent de décrire sur un seul spécimen des formes qui peuvent être variables, ou qui présentent habituellement chez les espèces connues du même groupe des différences sexuelles notables, pour ces motifs, certains groupes, par exemple *Cryptorhynchus*, *Bagous*, *Apion*, n'ont pu être complètement étudiés, mais l'existence au Chaco bolivien de véritables *Bagous* n'en est pas moins fort remarquable.

Conformément aux intentions de MM. C. Lizer et L. Delétang cette collection a été déposée au Museum de Paris qui possédera ainsi, sauf indication contraire, tous les types des espèces décrites dans le présent travail.

Pseudopantomorus Sharpi Hell., *Anal. Soc. Cient. Arg.*, XCI, pág. 6, fig. 1.

Santa Cruz (IX, 1917); Villa Montes (XI, 1917); Yacuiva (VIII, 1917); Lagunillas (XI, 1917); Yzozo (VIII, 1917); Cuatro Ojos (XI, 1917).

Nombreux spécimens.

Signalée par Heller du Tucumán (C. Bruch) et du Paraguay (coll. Faust) cette espèce est très répandue dans le Chaco bolivien comme on le voit par les localités citées ci-dessus.

Archopactus cyphoides Hell., *l. c.*, pag. 8, fig. 3.

Espèce décrite du Tucumán (C. Bruch).

Bolivie : Lagunillas (XI, 1917); Yacuiva (VIII, 1917).

var. *griseomaculatus* n. var.

Revêtement dorsal des élytres dense, fauve, entremêlé de nombreuses petites taches cendrées.

République Argentine : Río Salado, Chaco de Santiago (ma coll.).

Chez cette espèce le ♂ n'a pas de caractères secondaires spéciaux ; il est seulement un peu plus petit que la ♀ mais de forme semblable.

Le revêtement est variable chez cette espèce comme chez tous les *Naupactides* (1). La forme type a le dos des élytres « pallide cervino-squamosis, raro squamulis albis dispersis », la v. *griseomaculatus* a un fascies tout différent et semble être la forme la plus commune.

Hoplopactus lateralis Arrow, *Proc. zool. Soc. Lond.*, 1903, II, pag. 251, pl. 28, fig. 3.

Santa Cruz (IX, 1917); Cuatro Ojos (IX, 1917).

Espèce décrite de Matto Grosso.

Naupactus pithecius Germ.

Santa Cruz (IX, 1917).

Cette forme bolivienne diffère légèrement de la forme type du Brésil par la ponctuation élytrale du ♂ plus forte et plus régulière.

Naupactus Lizeri n. sp.

♂. Allongé, brun, les pattes et les antennes ferrugineuses, revêtu en dessus de squamules serrées d'un beau vert doré brillant, une large bande longitudinale sur le milieu du prothorax, la suture sur les deux premiers interstries de chaque côté, les bords latéraux des ély-

(1) Cette variabilité individuelle du revêtement chez les *Naupactus* a été notée, il y a déjà longtemps par Lacordaire.

tres, dénudés; muni sur les élytres d'une pubescence double, l'une très longue, dressée, fournie, flave sur les parties claires, foncée sur les parties dénudée, l'autre très courte, éparsée et presque couchée, le prothorax et la tête munis d'une pubescence courte; dessous uniformément revêtu de squamules serrées, vertes, moins brillantes que celles du dessus.

Tête et rostre à ponctuation fine, écartée, peu densément squamulés, finement canaliculés au milieu, le rostre plus étroit et presque aussi long que la tête, non élargi en avant. Yeux oblongs et saillants. Antennes longues et très fines, revêtues d'une pubescence cendrée dense et assez longue, tous les articles du funicule faiblement noueux au sommet et au moins du triple aussi long qu'épais, la massue étroite, allongée, fusiforme. Prothorax à peine plus large que long, faiblement et régulièrement arqué sur les côtés, assez fortement bisinué à sa base qui est finement rebordée et à peine plus large que le bord antérieur; disque convexe, marqué derrière le bord antérieur d'un fin sillon transversal plus profond sur les côtés, à sa base d'une petite fossette antéscutellaire, sur sa ligne médiane d'un sillon très fin, obsolète; à ponctuation superficielle et écartée, les points cachés par les squamules rondes qui les recouvrent, excepté sur la ligne médiane et une bande latérale, en dessous, mal déterminée. Écusson triangulaire, ponctué, dénudé. Élytres un peu plus larges à la base et trois fois aussi longs que le prothorax, arrondis assez fortement et isolément à la base, obtusément arrondis aux épaules, graduellement rétrécis des épaules au sommet, acuminés-arrondis ensemble à l'extrémité; ponctués-striés, les points des stries médiocres, peu serres, graduellement effacés vers la partie apicale, squamulés, ceux de la première rangée plus serrés, plus profonds et dénudés; interstries plans. Pattes assez longues; fémurs peu densément squamulés, inermes; tibias inermes sur leur tranche interne, munis d'une pubescence cendrée assez dense, les antérieurs médiocrement arqués en dedans au sommet; tarses allongés, velus, spongieux en dessous; ongles robustes et noirâtres.

♀. Forme générale plus large, moins élancée, les élytres à bords latéraux parallèles jusqu'au milieu, à revêtement presque uniforme, la suture squamulée quoique moins densément que les autres interstries, antennes plus courtes. Fémurs foncés. Long.: 10-12 mm. (1).

Santa Cruz (IX, 1917).

Quoique les tibias ne soient pas denticulés sur leur tranche inter-

(1) Longueur du rostre non comprise.

ne, cette espèce; par l'ensemble de ses caractères est bien un vrai *Naupactus*.

Le mâle est très constant de coloration, les 25 individus examinés étant identiques. Par contre, la femelle passe du vert au gris uniforme avec les mélanges intermédiaires de ces colorations et prend ainsi un fascies tout différent, sans qu'aucun caractère plastique autorise la dénomination de ces formes même comme simple variété. Voici ces variations :

Var. *a* ♀. Revêtement vert et d'un cuivreux doré, ce dernier plus abondant sur les interstries pairs. Santa Cruz (IX, 1917).

Var. *b* ♀. Revêtement, formé en majeure partie de squamules d'un gris cendré, entremêlées de squamules vertes. Santa Cruz (IX, 1917).

Var. *unicolor* ♀ n. var. Revêtement cendré ou cendré-flave, uniforme, recouvrant le dessus et le dessous, sans aucune bande dénudée. Santa Cruz (IX, 1917), Cuatro Ojos (IX, 1917), Yacuiva (XII, 1917), un spécimen.

***Naupactus viridimicans* n. sp. ♀.**

Forme et taille de *N. Lizeri*, dont elle diffère par le prothorax un peu plus long, les élytres à épaules plus élevées, à bords latéraux sinués derrière les épaules et en arrière avant le sommet, les stries un peu plus fortes, distinctes jusqu'au sommet, et tout particulièrement par les soies très courtes et très nombreuses, et les tibias antérieurs denticulés sur leur tranche interne. Brun, les antennes foncées, les pattes ferrugineuses, densément revêtu de squamules vertes et rosées, assez brillantes. Tête à squamules rosées sur les bords, vertes dans le centre; rostre à squamules vertes, sillonné ainsi que la base de la tête. Antennes à pubescence courte et très éparse. Prothorax aussi long que large, couvert de squamules vertes et roses, mêlées, parfois avec des traces de bandes latérales roses. Élytres munis de soies courtes et très nombreuses, ornés d'un dessin vert sur fond rose, ce dessin vert formé sur chaque élytre d'une tache sur le calus huméral, d'une linéole arquée autour de l'épaule, de deux macules allongées sur le 3^e interstrie, l'une vers la base, l'autre au tiers antérieur, de deux linéoles parallèles, sur le milieu des 3^e et 5^e interstries, d'un grand anneau sur le calus apical encerclant une linéole rose. Fémurs presque entièrement verts; tibias et tarses testacés, pubescents, éparsément squamulés, les tibias antérieurs seuls finement denticulés sur leur bord interne; ongles noirâtres. Dessous en majeure partie

rose, revêtu d'une pubescence dense sur l'abdomen; trochanters verts: épimères et épisternes bordés de vert. Long. : 12 mm.

Cuatro Ojos, type (IX, 1917); Santa Cruz (IX, 1917).

Un spécimen de chacune de ces localités.

Naupactus glaucivittatus Blanch., *Voy. d'Orb.*, 1843, pag. 202, pl. 17, fig. 13.

Villa Montes (XI, 1917); Yacuiva (VIII, 1917).

Naupactus fatuus Bohem., in *Schönh. Gen. Curc.*, I, pag. 588.

Santa Cruz (IX, 1917); Yacuiva (VIII, 1917).

Naupactus flavipennis Bohem., in *Schönh. Gen. Curc.*, VI, 1, pag. 55.

Santa Cruz (IX, 1917).

Naupactus denudatus n. sp.

♂. Subcylindrique, allongé, noir, peu brillant, paraissant dénudé, glabre, revêtu (vu sous un assez fort grossissement) de très petites squamules rondes, cendrées et espacées, muni sur la déclivité postérieure des élytres de soies dressées, blanches, assez courtes, peu nombreuses; écusson et épimères métathoraciques densément couverts de squamules blanches, mates.

Rostre aussi long que la tête, un peu élargie au sommet, légèrement déprimé longitudinalement, muni en son milieu d'un profond sillon longitudinal prolongé en arrière jusqu'au vertex, brièvement déprimé autour de l'échancrure apicale, celle-ci forte et bordée de soies rousses, couverte de points médiocres mais serrés et confluent en rides longitudinales sur les bords. Tête à ponctuation éparse, fine, dans le milieu, plus forte et confluent en rides autour des yeux. Yeux oblongs et saillants. Antennes longues et assez robustes; scape brusquement et fortement claviforme au sommet, atteignant juste le bord antérieur du prothorax, revêtu d'une pubescence fine, cendrée, appliquée, peu serrée; funicule revêtu d'une fine pubescence cendrée appliquée, peu serrée, tous ses articles munis en outre vers leur sommet de quelques longues soies hérissées, le 1^{er} article le plus court, obconique, le 2^e du double de la longueur du 1^{er}, noueux au sommet, les articles 3-7 peu différents de longueur, peu épaissis au sommet, et au moins du triple aussi longs qu'épais; massue fusiforme, étroite, cendrée. Prothorax aussi long que large à la base, peu plus étroit en avant qu'en arrière, les bords latéraux régulièrement et médiocrement arqués, la base

subtronquée et brièvement relevée, les angles postérieurs aigus; disque peu convexe, couvert de granules aplatis, petits et très serrés. Écusson triangulaire revêtu de squamules blanches très serrées. Élytres à peine aussi larges ensemble que le prothorax en son milieu, et à peine du double aussi longs que le prothorax, très légèrement échan-crés en arc à leur base, les épaules arrondies, graduellement rétrécis des épaules au sommet; peu convexes en avant, plus fortement au milieu, fortement et brusquement déclives en arrière; assez fortement ponctués-striés, les interstries légèrement convexes, formant en avant quelques rugosités transversales, indistinctement pointillés. Pattes robustes; fémurs lisses, éparsément squamulés et pubescents, les antérieurs fortement renflés, tibias pubescents, parfois d'un brun foncé, vilieux au sommet, les antérieurs assez fortement denticulés et faiblement bisinués sur leur tranche interne, brièvement arqués en dedans au sommet et munis d'un petit ongllet apical interne; tarses d'un brun foncé, allongés, pubescents hérissés en dessus, spongieux en dessous; onychium long et velu, les ongles grands et robustes. Dessous à ponctuation fine et peu serrée, les points émetant chacun une courte squamule sétiforme. Segment anal marqué en son milieu d'un large et profond sillon longitudinal.

♀. Forme plus large; bords de la tête et rostre plus fortement ponctués striolés; antennes un peu plus courtes; prothorax moins arrondi sur les côtés; élytres dès la base un peu plus larges que le prothorax, graduellement et assez sensiblement élargis jusque un peu au delà du milieu, brusquement rétrécis en arrière, les stries plus fortes, les interstries plus convexes et plus rugueux; tarses plus courts. Long. : 9-11 mm.

Villa Montes, types ♂ ♀ (XI, 1917); Yacuiva (VIII, 1917).

Une vingtaine de spécimens de la forme typique.

Var. *vicinus* n. var. ♀.

Dessus revêtu de squamules grises ou d'un gris-jaune, plus serrés sur les bords, dessous revêtu de squamules de même coloration mais plus fines et moins serrées.

Cette variété d'un fascies bien différent de celui de la forme typique se trouve mélangée à cette dernière à Villa Montes et Yacuiva.

Naupactus quatuordecimpunctatus n. sp.

Oblong, brun; les pattes et les antennes rousses, très densément revêtu de squamules ovales grisâtres, le prothorax avec 14 points

dénudés, les élytres munis de fines soies soulevées mêlées en arrière de longues soies dressées.

Rostre court, pas plus long que large à la base, légèrement triangulaire, plan en dessus, muni à sa base d'un fin sillon médian prolongé en arrière jusqu'au vertex, déprimé et fortement échancré au sommet, muni en outre de chaque côté d'une petite carène obtuse au-dessus de l'insertion antennaire; couvert de squamules serrées, grandes, ovales acuminées, concaves, entrêmelés de courtes soies, la dépression apicale avec des squamules rondes, planes, peu serrées, les soies plus longues, les cils de la bouche très longs. Antennes médianes, grêles, allongées, pubescentes; scape atteignant juste le bord antérieur du prothorax; tous les articles du funicule beaucoup plus longs que larges, le 2° très long, une fois et demi aussi long que le 1^{er}, le 3° plus court que le 1^{er}, le 5° plus long que les 4° et 3°, les 6° et 7° plus courts, la massue fusiforme. Tête convexe, squamulée comme la base du rostre, les yeux saillants. Prothorax subcylindrique, aussi long que large, modérément rétréci en avant, légèrement arrondi sur les côtés, la base assez fortement rebordée et tronquée; convexe, la sculpture cachée par le revêtement analogue à celui de la tête; orné de 14 points dénudés assez forts, dont 4 dans le milieu disposés en carré, et 5 de chaque côté non loin des bords, 2 en avant, 2 en arrière, 1 gros, en forme de fossette près du milieu, les 3 points internes à peu près en ligne droite, les points extérieurs plus rapprochés entre eux que les points internes extrêmes. Écusson triangulaire, petit, dénudé. Élytres oblongs, leur plus grande largeur au milieu, deux fois et demie aussi longs que le prothorax, ensemble légèrement échancrés en arc, et à peine plus larges à leur base que le prothorax, l'angle latéral de la base marqué et légèrement saillant en dehors; stries fines, ponctuées, interstries larges, légèrement convexes; le revêtement dense, formé de squamules planes ou convexes, les soies longues nombreuses en arrière, rares en avant. Pattes élancées, densément squamulées; fémurs inermes; tibias antérieur spinulés sur leur tranche interne, légèrement arqués au sommet, armés d'un onglet apical interne fort; les autres tibias droits et inermes; 1^{er} article des tarsi aussi long que les 2° et 3° ensemble. Dessous densément squamulé, mais criblé de petits points dénudés d'où naissent de courtes soies blanches, le milieu des segments abdominaux dénudé. Long.: 10-12 mm.

Bolivie: Yacuiva (XII, 1917), type.

Symmathetes setulosus n. sp.

Ovale, brun, revêtu d'une couche compacte de squamules d'un gris jaunâtre, entremêlées par places de squamules brun-foncé formant quelques petites taches éparses, muni en outre en dessus de nombreuses soies redressés, claires, assez longues et alignées sur les interstries des élytres, beaucoup plus courtes et dirigées en avant sur le prothorax et la tête.

Rostre aussi long et à sa base aussi large que la tête, cunéiforme, densément squamulé et sétosulé, muni d'un étroit sillon longitudinal commençant dans une petite fovéole placée en son milieu et prolongée en arrière jusque sur le vertex. Antennes assez courtes, ferrugineuses, sétosulées; articles 3-7 du funicule obconiques, la massue ovale, assez grosse. Yeux coniques, très saillants. Prothorax aussi long que large à la base, cette dernière rebordée et à peine aussi large que le bord antérieur, les côtés médiocrement arrondis; marqué de trois impressions transversales, étroites, l'une derrière le bord antérieur plus profonde vers les côtés, la deuxième courte, latérale vers le milieu des côtés, la troisième en avant du rebord basal. Élytres ovales à peine du double de la longueur du prothorax, convexes, assez fortement ponctués-striés, les points des stries dépourvus de soies, les interstries beaucoup plus larges que les stries, convexes, munis chacun d'un rang de soies. Pattes squamulées et sétosulées; tibias antérieurs fortement denticulés sur leur tranche interne. Long.: 5-5,2 mm.

Brésil: Goyaz, Porto Nacional (coll. E. Cordier et la mienne). Quinze spécimens; Bolivie: Villa Montes (XI, 1917).

L'unique spécimen de Bolivie a les côtés du prothorax et une fascie élytrale postmédiane plus clairs mais il est identique quant aux autres caractères aux spécimens du Brésil.

Menetypus maculatus n. sp.

Brun roux, revêtu en dessus de squamules d'un blanc teinté de crème, les élytres ornés d'une tache médiane et latérale et d'une fascie transversale antéapicale d'un blanc plus clair, la tache et la fascie bordées de brun. Antennes, tibias et tarses d'un testacé clair.

Rostre plus court que la tête, subparallèle, densément squamulé, finement sillonné longitudinalement, éparsément ponctué. Tête convexe à ponctuation éparsée. Yeux assez saillants. Prothorax visiblement plus long que large à la base, cette dernière notablement plus

étroite que le bord antérieur, les côtés médiocrement dilatés-arrondis au tiers antérieur, assez fortement étranglés vers la base, les angles postérieurs droits; transversalement impressionné vers le tiers antérieur et le long du rebord basal; couvert de gros points, profonds, peu serrés; densément squamulé. Écusson petit triangulaire. Élytres obtusément arrondis aux épaules, élargis de ces dernières jusqu'au delà du milieu, rétrécis-acuminés ensemble au sommet; plans sur le disque, brusquement déclives en arrière, la suture formant une petite gibbosité au sommet de la déclivité traversé par la fascie blanche et ondulée; stries ponctuées assez fortes, les interstries convexes. Pattes antérieures très développées, les fémurs très gros, squamulés et pubescents, les tibias arqués pubescents et denticulés sur leur tranche interne. Dessous blanc. Long. : 5-6 mm.

République Argentine : Río Paraná, territoire des Missions, type (ma coll.); Bolivie : Santa Cruz (IX, 1917), Cuatro Ojos (XI, 1917).

Menetypus albus n. sp.

Brun foncé, les pattes et les antennes ferrugineuses, revêtu en dessus et en dessous d'une couche compacte de squamules blanches.

Rostre à peine plus étroit et un peu plus long que la tête, largement et assez profondément déprimé en dessus, muni en son milieu d'un sillon longitudinal fin et court, profondément échancré au sommet, l'incision ciliée, couvert ainsi que la tête de points profonds et espacés. Antennes subglabres, le sommet des articles muni seulement de quelques cils courts, premier article du funicule subconique beaucoup plus gros et plus long que le 2^e, la massue oblongue. Yeux saillants. Prothorax plus long que large à la base, les bords latéraux dilatés-arrondis dans leur milieu, étranglés légèrement en avant, fortement à la base, la base beaucoup plus étroite que le bord antérieur étroitement rebordée et précédée d'une impression transversale étroite; disque à convexité irrégulière, largement impressionné transversalement en avant, le bord antérieur relevé, couvert de gros points profonds mais espacés. Écusson blanc. Élytres à peine plus larges à la base que le prothorax au milieu, les épaules brièvement arrondies, graduellement élargis des épaules jusque vers le tiers postérieur; ponctués-striés, les points serrés, beaucoup moins gros que ceux du prothorax, les interstries convexes. Pattes éparsément ponctuées, couvertes de fines squamules blanches; tibias antérieurs presque droits, denticulés sur leur tranche interne. Long. : 4,5-5 mm.

République Argentine : Chaco de Santiago, type (ma coll.); Bolivie : Villa Montes (XI, 1917); Brésil : Mendès à 92 kilom. du Rio de Janeiro (ma coll.).

BRACHYSTYLODES n. gen. (Cyphini).

Rostre court, épais; pourvu de cicatrices mandibulaires, échancré au sommet, l'échancrure ciliée sur ses bords, scrobes latéraux, étroits, profonds, en avant, arqués, s'élargissant dès l'insertion des antennes. s'effaçant devant les yeux. Antennes dépassant à peine la base du prothorax, le scape arqué, épaissi au sommet atteignant le bord postérieur de l'œil, les deux premiers articles du funicule allongés, le deuxième le plus long, la massue ovale. Yeux latéraux, légèrement oblongs, convexes. Prothorax subcylindrique, tronqué en avant, faiblement bisinué à la base. Écusson arrondi. Élytres bisinués et plus larges que le prothorax à la base, pourvus de dix stries-ponctuées, entières. Pattes antérieures un peu plus longues et un peu plus robustes que les autres; fémurs inermes; tibias antérieurs, légèrement arqués en dedans au sommet, denticulés sur leur tranche interne, tibias intermédiaires et postérieurs à corbeille ascendante, longue, densément ciliée, celle des tibias postérieurs fermée et squamulée au sommet; tarsi spongieux en dessous, les deux premiers articles allongés, le 3^e plus court, bilobé; ongles soudés à la base. Deuxième segment abdominal beaucoup plus long que les 3^e et 4^e réunis, séparé du premier par une suture fine et légèrement anguleuse au milieu; saillie intercoxale postérieure plus large que la hanche, légèrement arquée en avant. Épimère mésothoracique s'avancant le long de l'épisternite jusqu'à la base même de l'élytre. Insecte ailé.

Ce genre voisin de *Brachystylus* Schön. s'en distingue par la conformation des scrobes et des tibias.

Brachystylodes pilosus n. sp.

Brun, les pattes ferrugineuses, revêtu de squamules d'un brun foncé et blanchâtres, ces dernières formant un dessin irrégulier et variable composé de deux bandes longitudinales sur le prothorax, parfois reliées entre elles par une bordure basale, d'une bordure large et irrégulière aux élytres, d'une linéole sur la base du 3^e interstrie. d'une tache transversale près du milieu des 3^e et 4^e interstrie, d'une fascie transversale au sommet de la déclivité postérieure le plus sou-

vent reliée à la bordure apicale par une bande suturale; dessous et pattes revêtus de squamules blanchâtres; muni en outre de soies en majeure partie brunes, assez longues, dressées et alignées sur les interstries des élytres, plus courtes dirigées en avant sur le prothorax la tête et le rostre.

Tête et rostre à ponctuation allongée, confluent en rides longitudinales voilées par le revêtement, parcourus par un sillon longitudinal étroit et profond. Rostré déprimé au sommet, plus court que la tête. Antennes ferrugineuses, le scape squamulé et pubescent, tous les articles du funicule plus longs que larges ainsi que la massue. Prothorax moins long que large, à peine arqué sur les côtés rugueux-granulé, la granulation voilée par le revêtement. Élytres, à la base presque du double de la largeur du prothorax, les épaules en angle droit brièvement arrondi, un peu élargis des épaules jusqu'au tiers postérieur, arrondis ensemble au sommet; convexes, fortement déclives en arrière, fortement striés-ponctués, les points serrés, les interstries convexes et plus larges que les stries. Pattes sétosulées, les fémurs médiocrement claviformes, les antérieurs plus épais et armés en dessous de 3-4 épines courtes, les tibias intermédiaires et postérieurs droits; tarsi squamulés et pubescents en dessus. Long.: 5-7 mm.

Bolivie : Cuatro Ojos (XI, 1917), type; Santa Cruz (IX, 1917), nombreux spécimens.

Cyphus inhalatus Germ.

Bolivie : Lagunillas (XI, 1917); Yacueva (VIII, 1917).

Compsus molitor Rosensch.

Bolivie : Santa Cruz (IX, 1917); Villa Montes (XI, 1917).

Compsus albarius Bohem.

Bolivie : Cuatro Ojos (IX, 1917). Un spécimen.

Compsus argyreus L.

Bolivie : Santa Cruz (IX, 1917); Cuatro Ojos (IX, 1917); Izozo (VIII, 1917).

Nombreux spécimens de cette espèce variable de taille et de coloration.

Compsus bimaculatus n. sp.

Entièrement recouvert d'un enduit crétaqué chaque élytre orné d'une macule d'un brun noir placée un peu en arrière du milieu sur les 3^e, 4^e et 5^e interstries.

Rostre plus long que la tête, peu élargi au sommet, muni d'un sillon médian assez large prolongé sur la tête. Tête légèrement impressionnée latéralement en dessus contre les yeux et assez fortement impressionnée transversalement derrière les yeux. Yeux convexes. Antennes à soies blanches, les deux premiers articles du funicule de même longueur, les suivants obconiques, épais, peu plus longs qu'épais, le 5^e le plus court, la massue grisâtre. Prothorax plus long que large, un peu plus étroit en avant qu'à la base, faiblement arqué sur les côtés, le disque irrégulièrement convexe, marqué de fossettes profondes dont les plus grandes sont disposées en deux rangées transversales. Écusson arrondi. Élytres à épaules en angle obtus, une fois et demie aussi larges et plus du double aussi longs que le prothorax : séparément subacuminés au sommet ; ponctués-striés, les points gros et peu serrés, les interstries convexes, les impairs plus fortement relevés, le 3^e muni au sommet de la déclivité postérieure d'un gros tubercule obtus, le 5^e terminé au milieu de la déclivité postérieure par un petit tubercule ; convexe, le disque presque plan entre les troisièmes interstries, la déclivité postérieure verticale ; les interstries munis chacun d'un rang de soies blanches, très courtes, épaisses, espacées et presque couchées. Long. : 7-8 mm.

République Argentine : Chaco de Santiago, Río Salado, type (ma coll.) ; Bolivie : Izozo (VIII, 1917). Deux spécimens.

Polyteles Guerini Bohem.

Bolivie : Villa Montes (XI, 1917).

Polyteles Steveni Bohem.

Yacuiva (XII, 1917). Un spécimen.

Platyomus elegantulus n. sp.

Brun, densément recouvert en dessus de squamules d'un blanc de neige, la tête ; le rostre, les antennes, les pattes, le dessous, trois bandes longitudinales sur le prothorax, le bord latéral et deux fascies transversales dentelées sur les élytres d'un beau jaune-brun.

Rostre plus long que la tête, assez fortement impressionné de l'insertion antennaire au sommet, marqué d'un étroit sillon médian commençant près de sa base et prolongé jusqu'au vertex. Tête transversalement impressionnée derrière les yeux, ornée d'une tache blanche contre les yeux, en arrière, et d'une bande blanche latérale en dessous, plus ou moins longuement prolongée en avant sous le rostre et continuant en arrière celle du prothorax. Antennes très robustes; scape arqué, fortement aplati, très épais dès la base, atteignant juste le bord antérieur du prothorax; funicule à deuxième article subconique, plus long que le 1^{er}, aussi long que les 3^e et 4^e réunis, les 3^e et 4^e aussi longs qu'épais, le 5^e, 6^e, 7^e transversaux, graduellement élargis, rembrunis, la massue ovale acuminée et noire. Yeux convexes. Prothorax faiblement transversal, trapézoïdal, les côtés presque droits, la base fortement bisinuée mais à peine plus large que le bord antérieur; peu convexe, marqué sur les côtés de quelques rugosités transversales faibles et derrière le bord antérieur d'une ligne enfoncée; plus profonde latéralement; orné de quatre bandes longitudinales blanches et de trois brunes dont la médiane est élargie en avant. Écusson triangulaire, blanc teinté de jaune à la base. Élytres fortement bisinués et une fois et demi aussi larges à la base que le prothorax, les épaules obtusément arrondies et à peine projetées latéralement, le bord latéral faiblement sinué derrière l'épaule, convexes, finement ponctuées-sériées, les points distants, les interstries larges et faiblement convexes; ornés de deux fascies transversales jaunes, dentelées, composées de linéoles d'inégale longueur, placées l'une un peu avant le milieu, l'autre au sommet de la déclivité postérieure. Dessous et pattes jaunes; pattes munies de très courtes soies claires. Long. : 9-10 mm.

République Argentine : Chaco de Santiago, type (ma coll.); Tucumán : Colmenar (24, XII, 1899) (ma coll.). Bolivie : Lagunillas (XI, 1917). Un spécimen frotté.

L'un des spécimens de Santiago est dépourvu de la 1^{re} fascie élytrale et la 2^e fascie se réduit à des taches isolées; par contre ces mêmes fascies sont très développées chez les spécimens du Tucumán qui en ont en outre une 3^e basale de sorte que le dessin élytral est formé d'une série de linéoles blanches et jaunes alternées.

Eustylus bolivianus Marsh., *Ann. Nat. Hist.*, 1916, pag. 463.

Bolivie : Cuatro Ojos (XI, 1917); Santa Cruz (IX, 1917).

Hyphantus sp. ?

Santa Cruz, un spécimen appartenant à une espèce probablement nouvelle.

BOLIVIANUS n. gen. (**Phytoscaphides**).

Rostre beaucoup plus long et beaucoup plus étroit que la tête, plan en dessus, latéralement comprimé, les mandibules squamulées, triangulairement échancré au sommet, les ptérygies peu saillantes en dehors; scrobes latéraux, foveiformes et profonds en avant, s'élargissant fortement en devenant superficiels en arrière dès l'insertion des antennes; cette dernière partie entièrement squamulée, limité inférieurement et supérieurement par une fine arête légèrement flexueuse, atteignant le bord antérieur des yeux où ils sont aussi larges que ces derniers, la partie fovéiforme en partie visible de dessus. Tête courte, les yeux grands, latéraux, légèrement ovales, presque plats. Antennes subapicales, grêles; scape atteignant le bord antérieur du prothorax, faiblement épaissi au sommet; funicule de sept articles, tous plus longs que larges, le deuxième très long et presque du double aussi long que le premier, la massue oblongue, acuminée. Prothorax bisinué à sa base, le bord antérieur légèrement sinueux, faiblement avancé sur le vertex, latéralement muni de lobes oculaires larges, arrondis, mais peu saillants et pourvus d'une frange de cils courts. Un écusson assez grand. Élytres bisinés et beaucoup plus larges que le prothorax à leur base, les épaules brièvement arrondies, munis de 10 stries-punctuées entières. Pattes intermédiaires un peu plus courtes et un peu plus grêles que les autres; fémurs inermes, les postérieurs plus épais et épaissis dès la base; tibias droits, les antérieurs et intermédiaires faiblement élargis et brièvement arqués en dedans au sommet, les postérieurs plus fortement élargis au sommet, leur corbeille tarsale fortement cavernueuse et squamulée. Tarses longs, le 3^e article fortement bilobé, l'onychium long terminé par deux ongles libres et robustes.

Prosternum largement échancré en arc en avant. Hanches antérieures contiguës, les intermédiaires étroitement séparées, les postérieures largement séparées, la saillie intercoxale postérieure plus étroite que la hanche et subtronquée en avant. Deuxième segment ventral plus court que les 3^e et 4^e ensemble mais considérablement plus long que chacun d'eux pris isolément, séparé du 1^{er} par une suture légèrement sinueuse au milieu, le cinquième en triangle équila-

téral aussi long que les 3^e et 4^e réunis. Épisternes métathoraciques assez larges. Épimères mésothoraciques larges, atteignant le bord postérieur du prosternum sur une assez grande longueur.

Insecte ailé.

Par l'ensemble de ses caractères ce genre appartient aux *Phytocaphides* de Lacordaire.

Bolivianus variabilis n. sp.

Brun, les pattes et les antennes d'un rouge ferrugineux, densément revêtu en dessus et en dessous de squamules petites, rondes, vertes (type) ou cendrées (var.), muni en outre de soies blanchâtres, excessivement courtes et couchées sur les élytres, un peu plus longues et dressées sur le prothorax, la tête et le rostre.

Rostre densément squamulé, muni d'une fine ligne longitudinale prolongée sur la tête. Antennes à pubescence cendrée, courte et éparse. Prothorax un peu plus large que long, subcylindrique et d'égale largeur à ses extrémités (♂) ou un peu plus court, et plus large à la base qu'au bord antérieur (♀), faiblement arrondi sur les côtés (♂), un peu plus fortement dans le tiers postérieur (♀); médiocrement convexe, transversalement impressionné derrière le bord antérieur, la base fortement bisinuée et légèrement rebordée, finement ponctué-rugueux, mais la ponctuation cachée par le revêtement. Écusson arrondi au sommet, densément squamulé. Élytres subparallèles jusqu'au milieu, séparément acuminée brièvement au sommet; médiocrement convexes, la déclivité postérieure brusque, les stries fines, leurs points allongés et serrés; interstries larges, presque plans, de largeur peu régulière, le 6^e visiblement élargi vers son milieu. Pattes pubescentes, les fémurs finement et peu densément squamulés.

♀. Tibias antérieurs munis de quelques petits denticules sur leur tranche interne.

♂. Forme plus étroite, les tibias postérieurs armés d'un fort ongle dentiforme à l'angle apical interne. Long. : 5-6 mm.

Bolivie : Villa Montes (XI, 1917), types ; Santa Cruz (IX, 1917); Cuatro Ojos (IX, 1917); Yacuíva (XII, 1917); Lagunillas (XI, 1917). Nombreux spécimens.

La coloration varie du vert glauque uniforme au cendré-blanchâtre uniforme.

Conothorax luctuosus Lac.

Lagunillas (XI, 1917); Yacuíva (VIII, 1917).

WAGNERIELLA n. gen. (1) (**Promécopides**).

Rostre incliné, presque aussi large et un peu plus court que la tête, échancré au sommet, les ptérygies peu saillantes en dehors; pourvu de cicatrices mandibulaires; scrobes latéraux, linéaires, profonds, arqués, terminés en arrière au niveau inférieur des yeux dont ils restent assez éloignés, leur partie antérieure visible de dessus. Yeux grands, oblongs, latéraux, modérément saillants. Antennes submédianes; scape atteignant à peine le bord postérieur de l'œil, très différent suivant le sexe: ♂ arqué, mince à la base s'élargissant très fortement, son sommet plus large que celui des fémurs, en outre fortement comprimé aplati; ♀ mince, brusquement et modérément épaissi au sommet, indistinctement arqué à la base et non comprimé; funicule filiforme de sept articles, le 1^{er} court, le 2^e excessivement long, trois fois aussi long que le 3^e, ce dernier trois fois aussi long qu'épais et plus long que le 1^{er}, les suivants plus longs qu'épais, la massue oblongue articulée. Prothorax tronqué en avant, légèrement bisinué à la base. Écusson médiocre. Élytres légèrement bisinués et notablement plus larges que le prothorax à leur base, brièvement arrondis aux épaules, brièvement arrondis au sommet, pourvus de 10 stries-punctuées entières. Pattes médiocres, les antérieures à peine plus longues que les postérieures; fémurs inermes; tibias presque droits, les antérieurs un peu épaissis au sommet, les postérieurs à corbeille fortement caverneuse et squamulée; tarses intermédiaires et postérieurs robustes, le 1^{er} article allongé, le 3^e court et profondément bilobé; tarses antérieurs différents suivant le sexe: ♂ 1^{er} article très large, arrondi, dilaté en forme de palette, le 2^e presque aussi long mais beaucoup plus étroit que le 1^{er}, triangulaire, le 3^e court, large, profondément bilobé; ♀ 1^{er} article subcylindrique, peu élargi, le 2^e triangulaire et plus court, le 3^e bilobé; le 4^e article long, terminé par deux ongles robustes et libres.

Échancrure buccale petite, arrondie. Prosternum entier sur son bord antérieur. Hanches antérieures contiguës, les intermédiaires très rapprochées, les postérieures arrondies, médiocres, non contiguës au bords latéraux des élytres, la saillie intercoxale postérieure plus étroite que les hanches et obliquement tronquée de chaque côté en avant. Deuxième segment ventral un peu plus long que le troisième, sa suture avec le premier arquée en avant au milieu. Épisternes

(1) Dédié à MM. E. et R. Wagner.

métathoraciques assez larges. Épimères mésothoraciques acuminés au sommet, atteignant l'angle des élytres et du prothorax. Insecte ailé.

Le fascies de ce genre rappelle celui de certains *Cyphides* de petite taille, mais les pièces buccales visibles rattachent ce genre aux *Pro-mécopides* malgré l'absence de lobes oculaires au prothorax.

La conformation spéciale des antennes et des tarsi antérieurs chez le ♂ permet de le reconnaître aisément.

L'espèce typique est la suivante :

Wagneriella lineata n. sp.

Brun, les pattes et les antennes d'un ferrugineux foncé, revêtu en dessus de petites squamules brunes et blanchâtres, ces dernières formant quatre bandes longitudinales sur le prothorax et quelques linéoles sur les élytres particulièrement vers le sommet.

Rostre transversal, plan, densément couvert de squamules brunes sur le disque, cendrées sur les bords et en dessous. Tête courte, peu convexe, munie d'un fin sillon longitudinal, médian et prolongé sur la base du rostre, squamulée de brun en dessus, de cendré autour des yeux en dessous. Antennes à pubescence cendrée, très éparses, la massue foncée. Prothorax subcylindrique, fortement transversal, faiblement arqué sur les côtés, d'égale largeur à ses extrémités; convexe, marqué d'un fin sillon transversal derrière le bord antérieur, plus profond sur les côtés, et d'une légère impression transversale devant la base; densément et finement ponctué-granulé, mais la sculpture voilée par le revêtement, revêtu de squamules serrées, les squamules blanches formant quatre bandes séparées par trois bandes brunes dont la médiane est assez large, les deux latérales étroites. Écusson triangulaire, ponctué, squamulé, impressionné à son centre. Élytres une fois et demie aussi large et quatre fois aussi longs que le prothorax subparallèles jusqu'au quart apical, le calus huméral saillant; convexes, à déclivité postérieure oblique, les stries fines, un peu flexueuses en avant, ponctués, les points petits, serrés; interstries larges, faiblement convexes, finement ponctué-granulés, la sculpture voilée par le revêtement; couvert de squamules brunes et blanchâtres, ces dernières formant des linéoles sur le tiers antérieurs des interstries 6-11, et sur les interstries 2-8 sur la déclivité postérieure, le calus apical foncé. Fémurs épais, peu densément et finement squamulés; tibias rugueux et pubescents; premier article des tarsi postérieurs presque du double aussi long que le 2°. Dessous squamulé de cendré. Long. : 7-8 mm.

République Argentine : Chaco de Santiago, types (ma coll. ; acquis de Le Moul't ex Wagner). Bolivie : Lagunillas (XI, 1917). Un spécimen ♀, entièrement brun et défloré.

Wagneriella albula ♂ n. sp.

Brun, les pattes et les antennes ferrugineuses, densément revêtu en dessus de squamules cendrées teintées de bleuâtre sur le disque, de jaune orange sur les bords du prothorax, légèrement teintées de jaunâtre sur les élytres; pattes en totalité et scape des antennes densément revêtus de petites squamules d'un cendré. Teinté de bleuâtre; dessous cendré.

Rostre légèrement rétréci en avant, fortement impressionné au sommet. Prothorax un peu plus large et plus fortement arrondi sur les côtés que chez l'espèce précédente. Écusson petit, squamulé. Élytres graduellement quoique faiblement rétrécis dès les épaules, le calus huméral à peine saillant; stries plus fortes; interstries convexes, les impairs un peu plus larges que les pairs; couvert de squamules serrées entremêlées de nombreuses et très courtes soies dressées, claires. Premier article des tarsi antérieurs en palette plus large que le sommet du scape; premier article des tarsi postérieurs notablement moins épais que dans l'espèce précédente. Quant au reste semblable à *W. lineata*. Long. : 7 mm.

République Argentine : Chaco de Santiago, type (ma coll.). Bolivie : Santa Cruz (IX, 1917).

L'unique spécimen de cette dernière provenance ne diffère du type que par la coloration des bords du prothorax qui est cendrée-blanchâtre au lieu d'être d'un jaune orange, les élytres d'un cendré uniforme tandis que chez le type ils ont quelques petites taches foncées mal définies.

Promecops carinicornis n. sp.

Noir brun, les pattes et les antennes ferrugineuses, revêtu de squamules rondes d'un brun foncé sur le dessus du corps, cendrées en dessous, sur la déclivité postérieure des élytres, sur l'écusson et une tache latérale triangulaire posthumérale, muni en outre de soies dressées assez longues de la coloration du fond.

Rostre un peu plus long que la tête, légèrement rétréci au niveau de l'insertion antennaire, plan et finement sillonné longitudinalement, le sillon prolongé sur la tête, densément squamulé excepté au sommet. Tête munie de soies dressées presque aussi longues que celles

du prothorax, le front entre les yeux aussi large que le rostre entre l'insertion des antennes. Antennes pubescentes, les articles du funicule graduellement épaissis, la massue aussi longue que les 4 articles précédents réunis. Prothorax transversal, aussi large en avant qu'à la base, fortement arqué sur les côtés, sa plus grande largeur au milieu, le bord antérieur subtronqué, les lobes oculaires larges, arrondis et avancés; couvert de gros points, assez serrés et squamulés, muni en son milieu d'une carène fine, noire, lisse, atteignant la base, mais non le sommet. Écusson arrondi, blanc. Élytres à peine une fois et demie aussi larges et deux fois et demie aussi longs que le prothorax, légèrement échancrés en arc à la base, les épaules en angle obtus, net, les bords latéraux parallèles jusqu'au tiers apical, arrondis ensemble au sommet: convexes, assez fortement ponctués-striés, les points munis au fond d'une squamule ronde et blanche, les interstries convexes, plus larges que les stries, munis chacun d'un rang de soies dressées: ornés chacun d'une tache cendrée, grande, triangulaire, s'étendant du bord latéral, contre l'épaule jusque sur le 3^e interstrie où elle est très rétrécie; la déclivité postérieure est aussi entièrement cendrée. Pattes assez courtes et assez robustes, hérissées de nombreuses soies blanches, les fémurs couverts en outre de squamules cendrées et ornés vers leur milieu d'un large anneau brun; corbeilles tarsales postérieures assez fortement cavernueuses; ongles soudés à la base. Long.: 3-3,2 mm.

Brésil: Yatahy, type (ma coll.). Bolivie: Santa Cruz (IX, 1917).

Promecops brevis n. sp.

Brun-noir, les antennes et les tarsi ferrugineux, revêtu en dessous de squamules cendrées, en dessus de squamules variées brun-noir, brun-clair et cendrées-jaunâtres, ces dernières couvrant l'écusson, la déclivité postérieure des élytres et sur chacun de ces derniers formant une grande tache humérale; muni en outre de soies de la coloration du fond, assez longues et presque verticales sur les élytres, plus courtes et penchées en avant sur le prothorax la tête et le rostre.

Rostre à peine plus long et très peu plus étroit que la tête, plan, densément squamulé, finement sillonné au milieu, le sillon antéoculaire limité en dedans par une assez vive et courte carène. Tête plane, squamulée et sillonnée comme le rostre. Antennes finement pubescentes, la massue oblongue. Prothorax aussi long que large en avant, les bords latéraux faiblement arqués en avant jusqu'au milieu, plus for-

tement rétrécis en arrière, la base subtronquée et visiblement plus étroite que le bord antérieur, le bord antérieur subsinué et légèrement avancé sur le vertex, les lobes oculaires larges, arrondis et avancés; marqué de gros points profonds, squamulés, confluent, particulièrement vers les bords, en sillons transversaux rendant la surface inégale; couvert de squamules d'un brun foncé, orné de chaque côté d'une bande peu régulière d'un blanc-jaunâtre. Écusson arrondi, plan, blanchâtre. Élytres en ovale court, peu plus longues que larges en leur milieu, légèrement échancrés en arc à leur base, les épaules très obliques, l'angle huméral très obtus et peu accusé, les côtés arqués, brièvement arrondis ensemble au sommet; fortement convexes, la convexité (vue de côté) régulière et présentant son maximum vers le milieu du dos; fortement ponctués-striés, les points pupillés, les interstries très convexes, munis chacun d'un rang de soies dressées. Pattes hérissées de soies cendrées et squamulées, les fémurs ornés en leur milieu d'un large anneau brun. Corbeilles tarsales postérieures assez fortement cavernueuses; ongles cornés à la base. Long.: 4 mm.

Bolivie: Santa Cruz (IX, 1917).

Promecops puncticollis n. sp.

Brun noir, le revêtement blanc en dessous, d'un brun rouge en dessus, varié sur les élytres de nombreuses petites taches blanches et d'un brun foncé; l'écusson blanc; le prothorax avec deux bandes dorsales, longitudinales, foncées, et quatre points blancs transversalement disposés vers le milieu.

Rostre légèrement conique (vu de face), les pterygies à peine saillantes latéralement, beaucoup plus long et à sa base aussi large que la tête, plan en dessus et muni d'un fin sillon longitudinal presque indistinct sur la tête, densément squamulé. Tête très fortement transversale, très courte, le front entre les yeux notablement plus large que le rostre entre l'insertion des antennes. Antennes ferrugineuses presque glabres, la massue oblongue. Prothorax aussi long que large à la base, d'égale largeur à ses extrémités, les côtés peu arqués en avant, presque rectilignes dans leur moitié postérieure, le bord antérieur légèrement sinué et avancé sur la tête, les lobes oculaires larges, arrondis, la base nettement bisinuée; médiocrement convexe, à ponctuation fine, serrée, peu visible; le revêtement dense, orné de deux bandes discales foncées, de quatre points blancs placés sur une ligne transversale vers le milieu, deux rapprochés sur les bandes fon-

cées, deux sur les bords, et un peu plus en avant, ayant en outre de chaque côté du milieu, près du bord antérieur deux points blancs rapprochés. Écusson grand, arrondi, plan, blanc. Élytres une fois un tiers aussi larges et trois fois aussi long que le prothorax, subparallèles jusqu'au tiers postérieur, l'angle huméral obtus, net, largement arrondis ensemble au sommet; régulièrement convexes, fortement ponctués-striés, les points pupillés, les interstries peu plus larges que les stries, convexes, munis d'un rang de soies excessivement courtes, arquées, couchées, visibles seulement de profil avec un assez fort grossissement. Pattes ferrugineuses densément couvertes de squamules cendrées et munies de quelques poils cendrés soulevés, les fémurs postérieurs annelés de brun; corbeilles tarsales postérieures médiocrement cavernueuses; ongles cornés à la base. Long. : 3,5-4 mm.

République Argentine: Río Paraná, territoire des Misiones, type (ma coll.); sept individus. Bolivie: Santa Cruz (IX, 1917). Un spécimen.

Promecops carinellus n. sp.

Brun noir, le revêtement d'un jaune grisâtre plus foncé, brunâtre, sur le disque du prothorax la base et une vague fascie transversale postmédiane des élytres.

Rostre à peine plus long que la tête, large, nettement et fortement rétréci au niveau de l'insertion antennaire, ses bords fortement sinués, les ptérygies fortement saillantes en dehors, longitudinalement déprimé et muni d'un fin sillon médian, densément squamulé. Tête large, le front entre les yeux un peu plus étroit que le rostre entre l'insertion des antennes. Antennes robustes, ferrugineuses, assez densément pubescentes de cendré, la massue oblongue. Prothorax un peu plus long que large à la base, presque d'égale largeur à ses extrémités, les côtés faiblement dilatés un peu en avant du milieu, le bord antérieur largement avancé sur la tête, les lobes oculaires très larges mais relativement peu avancés, la base faiblement bisinuée; médiocrement convexe, un peu inégal, marqué de quatre légères impressions transversalement disposées derrière le bord antérieur, ces impressions à revêtement plus foncé, muni en son milieu, sur le tiers basal d'une très fine carène lisse; ponctuation fine, serrée; peu visible, cachée par le revêtement, ce dernier dense et entremêlé de quelques très courtes soies couchées. Écusson arrondi, grand, cendré. Élytres une fois et demie aussi larges et trois fois aussi longs que le prothorax, subparallèles jusqu'au tiers postérieur, isolément

faiblement arqués à leur base, les épaules saillantes, peu obliques, en angle faiblement obtus; médiocrement convexes, la déclivité postérieure brusque, presque verticale; fortement ponctués-striés, les points ronds, assez espacés, munis chacun d'une squamule ronde et plus claire que le reste du revêtement, les interstries plus larges que les stries, faiblement convexes, munis d'un rang de soies courtes, arquées et soulevées, de la coloration du fond; la portion foncée du revêtement formant à la base une large tache, mal limitée ne couvrant ni les épaules ni les bords latéraux. Pattes robustes, densément squamulées, les fémurs finement et éparsément pubescents, les tibias hérissés de soies courtes et blanches; corbeilles tarsales postérieures fortement cavernueuses; ongles soudés à la base. Long.: 5 mm.

Bolivie: Santa Cruz (IX, 1917).

(À suivre.)